

Контингент обследованных	Код контингентов
Доноры (крови, биологических жидкостей, органов и тканей)	108
Медицинский и иной персонал, работающий с больными ВИЧ-инфекцией или инфицированным материалом	115
Лица при призыве на военную службу, поступающие на военную службу (приравненную службу) по контракту, поступающие в военно-учебные заведения	111
Обследованные добровольно по инициативе пациента (при отсутствии других причин обследования)	101
Лица, употребляющие психоактивные вещества	102
Мужчины, имеющие секс с мужчинами	103
Лица с подозрением или подтвержденным диагнозом инфекций, передаваемых половым путем	104
Лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексуальных услуг	105
Беременные	109
Мужья, половые партнеры женщин, поставленных на учет по беременности	110
Лица, находящиеся в местах лишения свободы	112
Больные с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции, СПИД-индикаторных заболеваний*	114*
Обследованные на ВИЧ при обращении за медицинской помощью (в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи), кроме больных гепатитами В, С	116
Лица с подозрением или подтвержденным диагнозом гепатита В или гепатита С	117
Прочие	118
Контактные лица, выявленные при проведении эпидемиологического расследования (кроме детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями)	121
Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями	124
Участники аварийной ситуации с попаданием крови и биологических жидкостей под кожу, на кожу и слизистые	125
Иностранные граждане и лица без гражданства	200

ВАЖНО!

Если у пациента несколько причин для обследования, то при оформлении «направления», его следует отнести к одному из контингентов с наименьшим кодом, при затруднении выбора кода, возможно проставить коды установленных причин обследования через дробь (102/116 или 102/110).

Для беременных единственным кодом выбирается код 109.

Кодирование причин обследования детей осуществляется как у взрослых

* Лица, обследуемые по клиническим показаниям (код 114):

- Больные с хотя бы одним из следующих клинических проявлений:
 - лихорадка более 1 месяца;
 - увеличение лимфоузлов двух и более групп свыше 1 месяца;
 - диарея, длящаяся более 1 месяца;
 - необъяснимая потеря массы тела на 10 и более процентов
- Больные с затяжными, рецидивирующими и возвратными пневмониями или пневмониями, не поддающимися обычной терапии
- Больные с затяжными и рецидивирующими гнойно-бактериальными или паразитарными заболеваниями, сепсисом

- Больные с подострым энцефалитом и слабоумием у ранее здоровых лиц
- Больные с волосистой (ворсистой) лейкоплакией языка
- Больные с хроническими и рецидивирующими бактериальными, грибковыми и вирусными заболеваниями кожи и слизистых, в том числе с рецидивирующей пиодермией
- Женщины с хроническими воспалительными заболеваниями женской репродуктивной системы неясной этиологии
- Лица с анемиями и другими цитопениями (лейкопения, тромбоцитопения, лимфопения) неясной этиологии
- Больные с подозрением или подтвержденным диагнозом
- Саркомы Капоши
- Лимфомы мозга
- Т-клеточного лейкоза
- Легочного и внелегочного туберкулеза
- Заболевания, обусловленного цитомегаловирусом
- Генерализованной или хронической формы инфекции, обусловленной вирусом простого герпеса
- Рецидивирующего опоясывающего лишая у лиц моложе 60 лет
- Инфекционного мононуклеоза (у лиц старше 13 лет)
- Пневмоцистоза (пневмонии)
- Токсоплазмоза с поражением центральной нервной системы
- Криптококкоза (внелегочного)
- Криптоспориоза
- Изоспороза
- Гистоплазмоза
- Стронгилоидоза
- Кандидоза пищевода, бронхов, трахеи или легких
- Глубоких микозов
- Атипичных микобактериозов
- Прогрессирующей многоочаговой лейкоэнцефалопатии
- Рака шейки матки (инвазивный)

- Кокцидиомикоза (диссеминированного или внелегочного)
- Лимфомы (в том числе неходжскинские, иммунобластные, лимфома Беркитта, Болезнь Ходжкина и другие)
- Сальмонеллезных (не тифоидных) септицемий возвратных
- Бактериальных инфекций (множественных или возвратных) у ребенка в возрасте до 13 лет
- Интерстициальной лимфоидной пневмонии у ребенка в возрасте до 13 лет
- Дети в возрасте до 13 лет с подозрением или подтвержденным диагнозом онкологических заболеваний
- Дети до 13 лет со следующими клиническими проявлениями:
 - длительная необъяснимая гепато-(сплено)-мегалия;
 - персистирующий/рецидивирующий необъяснимый паротит;
 - резкая задержка психомоторного и физического развития;
 - нейтропения $< 0,5 \times 10^9/\text{л}$;
 - тромбоцитопения $< 50 \times 10^9/\text{л}$
- Обследованные добровольно по инициативе пациента (при отсутствии других причин обследования)